

NECROVAC-P

واکسن قانقاریای عفونی کبد و ادماسیون

ترکیب واکسن

واکسن **نکرووک P**، با دارا بودن توکسوئید *Cl. novyi* در دو تایپ A و B (حداقل تیتراژ 3.5 I.U α -antitoxin در هر دز) با هدف ایمن‌سازی فعال نشخوارکنندگان کوچک و بزرگ در مقابله با عامل بیماری‌های هپاتیت نکروزان (بیماری سیاه) و ادماسیون فرموله شده است.

حیوان هدف

گاو و گاو میش، گوسفند و بز

برنامه واکسیناسیون با نکرووک P

واکسیناسیون اولیه (Primary Vaccination)

برنامه اولین تزریق که به عنوان **واکسیناسیون در روز صفر** در نظر گرفته می‌شود، در گروه‌های مختلف دامی مطابق جدول زیر است:

روش تزریق	زمان اولین تزریق (روز صفر)	میزان دز	نوع دام
زیر جلدی	در هر زمان با در نظر گرفتن سلامت دام	۲ میلی لیتر	گاو و گاو میش غیر آبستن با سن بالاتر از ۳ ماه
		۱ میلی لیتر	گوسفند و بز غیر آبستن با وزن بالاتر از ۴۵ کیلوگرم
	در طول دوره آبستنی (ترجیحاً نیمه دوم دوره آبستنی جهت انتقال ایمنیت از طریق آغوز به نوزاد)	۲ میلی لیتر	گاو و گاو میش آبستن
		۱ میلی لیتر	گوسفند و بز آبستن
	● از هفته دوم پس از تولد برای نوزادان متولد از مادران غیر واکسینه	۱ میلی لیتر در گوساله	نوزادان (گوساله، بره و بزغاله)
	● در هفته هشتم پس از تولد برای نوزادان متولد از مادران واکسینه	۰/۵ میلی لیتر در بره و بزغاله	



واکسیناسیون یادآور (Booster / Rappel)

در صورتیکه واکسن نکرووک P برای نخستین بار مورد استفاده قرار می‌گیرد (نظیر نوزادان و یا دامهایی که به تازگی به گله معرفی شده‌اند)، می‌بایست ۱۴-۲۱ روز پس از تزریق اول (روز صفر) واکسیناسیون یادآور را با دز و روش مشابه انجام داد.

تکرار واکسیناسیون (Revaccination)

با هدف تداوم بخشیدن به ایمنیت محافظت‌کننده، ۶ ماه پس از تزریق دوم (یادآور/راپل)، اقدام به تکرار واکسیناسیون دامها نموده و این امر هر ۶ ماه یکبار تکرار خواهد شد.

احتیاطات مصرف

- تزریق واکسن در دامهای زیر ۲ هفته ممنوع است.
- در صورت بروز ازدیاد حساسیت و یا شوک آنافیلاکسی باید بلافاصله درمان مطلوب صورت پذیرد (جهت توضیحات بیشتر به مدیریت واکسن و عملیات واکسیناسیون در دام مراجعه شود).
- واکسیناسیون تنها می‌بایست در دامهای سالم انجام شود زیرا دامهای بیمار و یا دچار نقص ایمنی (نظیر مبتلایان به اسهال ویروسی گاو (BVD) و لکوز گاو (BLV)) به سطح مطلوب ایمنی محافظت‌کننده نخواهند رسید.
- واکسیناسیون در یک سوم پایانی دوره آبستنی به دلیل احتمال بروز سقط خصوصاً در بزها می‌بایست با احتیاط کامل و رعایت اصول واکسیناسیون دامهای آبستن همراه باشد (جهت توضیحات بیشتر به مدیریت واکسن و عملیات واکسیناسیون در دام مراجعه شود).

عوارض جانبی

عوارض موقتی و زود گذر نظیر تب ملایم، درد و تورم در محل تزریق ممکن است در دامها مشاهده شود.

دوره پرهیز از مصرف

تا ۲۱ روز پس از واکسیناسیون از مصرف گوشت دام خودداری گردد. مصرف شیر پس از واکسیناسیون بلامانع است.


بسته‌بندی و عمر قفسه‌ای

واکسن نکرووک P در فلاکن‌های ۵۰، ۱۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ میلی‌لیتری عرضه شده

و تحت شرایط مطلوب نگهداری تا ۲ سال از تاریخ تولید اعتبار مصرف دارد.

برنامه ترکیبی مصرف نکر واک P با پلی واک CI یا پلی واک CI 7

چنانچه منطقه چرای گوسفندان و بزها آلودگی به فاسیولا دارد، بدلیل بروز بیماری هپاتیت نکر واک (قانقاریای عفونی کبد) ناشی از عفونت با *Cl. novyi*، توصیه می‌گردد برنامه واکسیناسیون پلی واک CI یا پلی واک CI 7 با واکسن نکر واک P ادغام شده و در قالب یک برنامه جامع با توالی اجرای ۶ ماهه محقق گردد:



نحوه واکسیناسیون ترکیبی دام با نکر واک P و پلی واک CI 7 یا پلی واک CI

